

CERDALAX

En las granjas comerciales las condiciones ambientales, el manejo, la formulación de los alimentos y el estado fisiológico de los animales pueden provocar problemas de estreñimiento, los cuales tiene impactos importantes, en distintas etapas de la producción:

PERI-PARTO

- Un tránsito lento permite el desarrollo de una flora bacteriana patógena que produce toxinas que inhiben la producción de prolactina (hormona indispensable para la inducción de lactación).
- Un buen confort digestivo durante los 5 días antes y después del parto, es esencial para evitar los problemas de cerdas secas al parto y de inducción a la lactación.

POST-MONTA

- El confort general y particularmente digestivo de las cerdas en los 20 días post-monta, es un factor importante para lograr una buena implantación así como asegurar una buena prolificidad.
- Al solucionar los problemas de estreñimiento, evitamos la producción de toxinas.

CERDALAX

- Sobre la escala de calificación de las heces, con la utilización de CERDALAX, aseguramos una evolución, llevando a los animales hasta el nivel 4 (vease tabla anexa).



CERDALAX

USO.

Cerdas en producción.
Top-Feeding.

PERIODO.

PERI-PARTO: 5 días antes y 5 días después del parto.

POST-MONTA: Durante 7 a 10 días.

DOSIS.

Dos Primeros días: 60 g/ cerda/ día.

Día siguientes:

Dosis definida según el estado de las heces del día dos.



Calificación de las heces del día 2	1	2	3	4	5	6
Dosis/Día/Cerda en los días posteriores (g)	100	80	60	60	40	40

PRESENTACION.

Harina
Sacos de 40 kg